



# FEPEG

FÓRUM DE ENSINO,  
PESQUISA, EXTENSÃO  
E GESTÃO

TRABALHOS CIENTÍFICOS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DEBATES MINICURSOS E PALESTRAS

23 A 26 SETEMBRO DE 2015  
Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro

ISSN 1806-549X

A HUMANIZAÇÃO NA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

REALIZAÇÃO



APOIO



## FRENECTOMIA LABIAL SUPERIOR: RELATO DE CASO

Autor(es): Nilcélia Santos Mendes, Naiara Alves Maciel Schiavinato, Melissa Barral Maia, Renato Mendes Almeida

O freio labial superior é uma dobra de membrana mucosa, localizado na linha média, que se estende da superfície interna do lábio superior até a sua inserção no tecido gengival, e promove a união de uma estrutura móvel à outra fixa. A hipertrofia ou o posicionamento anormal do freio podem dificultar a higienização, causar retração dos tecidos gengivais, limitação dos movimentos labiais, afetar a fonação e interferir na estética, podendo estar relacionado ao diastema entre os incisivos centrais. Como tratamento de anormalidades do freio pode ser realizada a frenectomia, remoção do freio e sua inserção óssea. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre o tema: frenectomia labial superior, e relatar o caso de um paciente portador de freio labial superior hipertrófico e diastema entre os incisivos centrais, que foi submetido a frenectomia na Clínica de Periodontia da Universidade Estadual de Montes Claros no ano de 2015. **Metodologia:** Foi realizada uma busca na base de dados Bireme com os descritores: “frenectomia labial” e “lip frenectomy”, com até 5 anos de publicação, foram selecionados 4 artigos para compor a revisão de literatura. Na técnica cirúrgica foi feita a remoção do freio, sua inserção óssea e do tecido fibroso interdentário, com preservação da papila. Um termo de consentimento próprio da universidade foi assinado pelo paciente para que o procedimento o pudesse ser realizado. **Resultados:** A frenectomia é um procedimento relativamente simples, que apresenta um bom prognóstico. O procedimento do presente caso apresentou uma boa cicatrização e o pós-operatório não apresentou complicações. A técnica utilizada visou um resultado estético, com remoção do tecido fibroso entre os incisivos e preservação da papila, a fim de permitir o fechamento do diastema a partir de posterior tratamento ortodôntico. **Conclusão:** Em virtude do que foi exposto, conclui-se que a frenectomia labial é um importante instrumento para tratamento de freio labial anormal e possibilita o fechamento de diastemas, propiciando harmonia no sorriso e um bom resultado estético.